


NAJPOMEMBNEJŠI KORAKI

Postopek polnjenja oz. polnjenja cevke infuzijskega seta

Kako se izognete prekomernemu dovajanju insulina kmalu po zamenjavi infuzijskega seta

Zelo pomembno je, da upoštevate spodnja navodila, v skladu s katerimi preprečite, da bi se med postopkom polnjenja oz. polnjenja cevke po membrani infuzijskega seta razlila tekočina:

- a) Po polnjenju rezervoarja morate med odstranjevanjem modrega vmesnika držati vialo za insulin v pokončnem položaju. S tem preprečite, da bi se insulin nehote prenesel na vrh rezervoarja, od koder bi lahko prešel na membrano infuzijskega seta.




Viala v
pokončnem
položaju

Ko odstranjujete rezervoar, držite vialo v pokončnem položaju.

- b) Če katera koli tekočina (na primer insulin, izopropilni alkohol ali voda) zaide na vrh rezervoarja ali v notranjost konektorja infuzijskega seta, lahko blokira membrano infuzijskega seta. Zaradi tega se med postopkom polnjenja oz. polnjenja cevke v komori rezervoarja za črpalko lahko poveča tlak. To lahko povzroči prekomerno polnjenje insulina kmalu po zamenjavi infuzijskega seta. Če na vrhu rezervoarja ali v notranjosti konektorja infuzijskega seta opazite tekočino, ponovite postopek z novim rezervoarjem in infuzijskim setom.

Vrh rezervoarja



Notranjost
konektorja
infuzijskega
seta

*Zagotovite, da sta vrh rezervoarja in
konektor ob priključitvi suha.*

Če po končanem polnjenju oz. polnjenju cevke opazite kar koli nenavadnega, na primer, če iz kanile infuzijskega seta še vedno kaplja ali brizga inzulin, ga ne vstavljajte. Ponovite postopek z novim rezervoarjem in infuzijskim setom.

Najboljše prakse za zamenjavo infuzijskega seta vključujejo te ukrepe:

- Ne zamenjajte infuzijskega seta, preden se odpravite spat, saj tako ne morete nadzirati ravni glukoze.
- Poleg rednega spremljanja v okviru dodatnih varnostnih ukrepov preverite raven glukoze v krvi 1 uro po zamenjavi infuzijskega seta.

Z upoštevanjem teh načel najboljše prakse boste lahko prepoznali morebitne pojave hipoglikemije in hiperglikemije in ustrezno ukrepali.